

DIABETES: FRÜHER & HEUTE

Hundert Jahre, eine Krankheit, zwei völlig verschiedene Welten

1920 war eine Diabetes-Diagnose bei einem Kind, praktisch gesehen, ein Todesurteil, gemessen in Monaten. Heute kann ein Kind mit derselben Diagnose einen münzgroßen Sensor tragen, ihn mit einem Handy verbinden, und einen Algorithmus still einen Großteil der Entscheidungen treffen lassen, die die Generation ihrer Großeltern nicht lange genug überlebte, um sie überhaupt zu treffen.

Kaum ein Bereich der Medizin hat sich so dramatisch, und so kürzlich, gewandelt wie das Diabetes-Management. Die 1920er brachten ein echtes Wunder: Insulin, gewonnen aus tierischen Bauchspeicheldrüsen, machte aus einer tödlichen Krankheit fast über Nacht eine überlebbare. Aber jahrzehntelang danach blieb der Alltag ein stumpfes, zermürbendes Ratespiel, gekochter Urin, feste Dosen und kaum echte Rückmeldung darüber, was im Körper tatsächlich vor sich ging.

Dieses Ratespiel verschwindet rasant. Diese Ausgabe verfolgt den gesamten Bogen, von Hungerstationen bis zu Sensoren, die direkt mit Insulinpumpen sprechen, und legt dar, was „modernes Management“ 2026 tatsächlich bedeutet, für jeden, der heute mit Diabetes lebt oder jemanden dabei unterstützt.

„Hundert Jahre später bleibt Insulin ein Eckpfeiler der Diabetesbehandlung, aber fast alles darum herum, wie es dosiert, überwacht und angepasst wird, wurde vollständig neu erfunden.“

Früher gegen heute

Ein paar Zahlen, die zeigen, wie weit, und wie schnell, sich die Diabetesversorgung bewegt hat.



Die Verzögerung zwischen „wir können Sie am Leben erhalten“ und „wir können tatsächlich sehen, was Ihr Blutzucker in Echtzeit macht“ dauerte über ein halbes Jahrhundert. Diese Lücke hat sich im letzten Jahrzehnt im Wesentlichen geschlossen.

Die Hungerkur-Ära und das Insulin-Wunder

Vor 1922 gab es keine echte Behandlung für Typ-1-Diabetes, nur das Management des Unvermeidlichen. Ärzte wie Frederick Allen und Elliott Joslin förderten extreme Kalorienrestriktion und Fastendiäten, die Patienten, besonders Kindern, manchmal ein paar zusätzliche Monate Leben verschafften, um den Preis schwerer Schwäche und Mangelernährung.

Der Durchbruch von Toronto

Das änderte sich im Januar 1922, als Frederick Banting und Charles Best, zusammen mit dem Biochemiker J.B. Collip, den 14-jährigen Leonard Thompson erfolgreich mit einem aus tierischen Bauchspeicheldrüsen gereinigten Insulinextrakt behandelten.

Innerhalb eines Jahres begann die kommerzielle Produktion, und Krankenhausstationen, die Diabetes bis dahin als langsames Todesurteil behandelt hatten, berichteten fast sofort von Patienten, die an Gewicht und Kraft zunahmen.

Der Haken: Grobe Werkzeuge, ständiges Raten

Frühes Insulin war ein grobes Werkzeug. Es stammte aus Rinder- und Schweinepankreas, variierte in Reinheit und Stärke zwischen den Chargen, und musste mit wiederverwendbaren Glasspritzen injiziert werden, die Patienten zur Sterilisation auskochten und von Hand schärften. Diabetes war von tödlich zu überlebbar geworden, aber „überlebbar“ bedeutete immer noch einen Alltag, der fast vollständig auf Annäherung beruhte.

Jahrzehnte des Ratens

Den Großteil des 20. Jahrhunderts bedeutete der tägliche Umgang mit Diabetes, mit bemerkenswert wenig echter Information zu arbeiten.

Zucker im Urin lesen, nicht im Blut

Jahrzehntelang war das einzige verfügbare Hilfsmittel zu Hause ein Urintest: eine Probe mit einer Kupferlösung aufkochen und auf einen Farbwechsel achten. Er war langsam, ungenau, und sagte den Patienten nichts darüber, was ihr Blutzucker gerade jetzt machte, nur ein grobes Echo der Werte von Stunden zuvor. Häusliche Blutzuckermessung, das Werkzeug, das den Menschen endlich Echtzeitwerte zeigte, kam erst Ende der 1970er, mehr als fünfzig Jahre nach Insulin selbst.

Dosierung nach Schema F

Ohne Echtzeit-Rückmeldung mussten Insulinschemata zwangsläufig starr sein: feste Dosen zu festen Zeiten, aufgebaut um feste Essenspläne, mit kaum Möglichkeit, sich an Bewegung, Krankheit oder eine unplanmäßige Mahlzeit anzupassen. Insulinpens erschienen erst 1985; davor bedeutete jede Dosis, Insulin mit einer Spritze aus einer Ampulle aufzuziehen. Insulinpumpen gab es zwar seit den 1970ern, blieben aber jahrelang groß, ungenau und für die meisten Menschen unzugänglich.

Der menschliche Preis des Nichtwissens

Wegweisende Studien in den 1990ern, die DCCT- und UKPDS-Studien, bewiesen etwas, das heute offensichtlich erscheint, aber nie streng nachgewiesen worden war: Straffere Blutzuckerkontrolle reduzierte spürbar Langzeitkomplikationen wie Nerven-, Nieren- und Augenschäden. Das Problem war, dass eine straffe Kontrolle mit den damals verfügbaren Werkzeugen außerordentlich schwierig war und mit einem deutlich höheren Risiko gefährlicher Unterzuckerung einherging.

Die Revolution der Überwachung

Wenn eine Technologie die moderne Ära der Diabetesversorgung definiert, dann die kontinuierliche Glukoseüberwachung, und ihre Wirkung ist kaum zu überschätzen.

Von einer Zahl am Tag zu einem konstanten Strom

Ein CGM-Sensor, am Arm oder Bauch getragen, misst rund um die Uhr alle paar Minuten den Glukosewert und sendet die Daten direkt an ein Handy oder Empfangsgerät, komplett mit Trendpfeilen und Warnungen, bevor ein Hoch oder Tief tatsächlich eintritt. Die ADA-Standards von 2026 erweiterten die CGM-Berechtigung auf im Wesentlichen jeden mit Insulin- oder Nicht-Insulin-Therapie, bei dem es helfen könnte, eine dramatische Erweiterung gegenüber nur wenigen Jahren zuvor.

Eine neue Art, Erfolg zu messen

Jahrzehntelang war der HbA1c-Wert, ein Drei-Monats-Durchschnitt des Blutzuckers, im Wesentlichen die einzige relevante Kennzahl. Er ist weiterhin wichtig, verbirgt aber enorme Schwankungen: Zwei Menschen können einen identischen HbA1c-Wert haben, während der eine wild zwischen Hoch und Tief schwankt und der andere bemerkenswert stabil bleibt. Time in Range (TIR), der Prozentsatz des Tages im gesunden Glukosebereich, hat sich als reichhaltigere, ergänzende Kennzahl etabliert, und aktuelle Leitlinien empfehlen inzwischen formal, sie zusammen mit dem HbA1c-Wert anzugeben.

Was sich dadurch tatsächlich ändert

- Weniger Fingerstiche, oft gar keine, für die tägliche Überwachung.

- Echtzeit-Warnungen vor einer gefährlichen Unter- oder Überzuckerung, nicht eine nachträgliche Entdeckung.
- Datenmuster, die Ärzte tatsächlich nutzen können, um die Behandlung feinzustimmen, statt einer einzelnen Zahl alle paar Monate.

Insulinabgabe bekommt ein Gehirn

Die Kombination kontinuierlicher Glukosedaten mit einer Insulinpumpe und einem intelligenten Algorithmus schuf etwas, das einst als Science-Fiction beschrieben wurde: ein System, das die Insulinabgabe selbstständig anpasst.

Hybrid-Closed-Loop wird zum Standard

Diese Systeme, oft als „künstliche Bauchspeicheldrüse“ bezeichnet, kombinieren drei Teile: ein CGM, das alle paar Minuten den Glukosewert misst, eine Pumpe, die präzise Insulindosen abgibt, und einen Algorithmus, der Dosierungsentscheidungen von Moment zu Moment trifft. Bis 2026 erreichten fünf von der FDA zugelassene Systeme über 70 % Zeit im Zielbereich bei unter 2 % Zeit in Unterzuckerung, und erstmals erstreckte sich die stärkste Empfehlungsstufe der ADA auch auf insulinpflichtigen Typ-2-Diabetes, nicht nur Typ 1.

Weniger Hürden zum Einstieg

Frühere Versionen dieser Systeme erforderten erhebliche Voraussetzungen, bevor ein Patient beginnen konnte. Die Leitlinienrevisionen von 2026 entfernten mehrere dieser Hürden gezielt, um den Zugang zur Technologie schneller zu ermöglichen.

Der nächste Schritt: Ganz ohne Kohlenhydratzählen

Vollständig geschlossene Systeme, derzeit in Entwicklung, zielen darauf ab, die letzte manuelle Aufgabe zu entfernen, das Ankündigen von Mahlzeiten oder geschätzten Kohlenhydraten, und stattdessen vollständig darauf zu setzen, dass der Algorithmus einen Glukoseanstieg erkennt und reagiert. Frühe Machbarkeitsstudien zeigten vielversprechende Time-in-Range-Ergebnisse selbst ohne jede Mahlzeiteingabe durch den Nutzer, wobei der Umgang mit dem Glukoseanstieg direkt nach dem Essen die zentrale technische Herausforderung bleibt.

Behandlung jenseits von Insulin

Der vielleicht am meisten unterschätzte Wandel in der modernen Diabetesversorgung ist gar kein Gerät, es ist die schiere Bandbreite heute verfügbarer Medikamente, von denen viele vor zwanzig Jahren kaum existierten.

Eine Regeländerung, die das Feld neu formte

2008 begannen Regulierungsbehörden zu verlangen, dass alle neuen Diabetesmedikamente kardiovaskuläre Sicherheit nachweisen. Diese eine politische Änderung beschleunigte die Entwicklung zweier Medikamentenklassen, GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Hemmer, die sich als nicht nur blutzuckersenkend, sondern auch spürbar herz- und nierenschützend erwiesen.

Von täglichen Injektionen zu wöchentlich, und jetzt zu Tabletten

- GLP-1- und duale GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten bieten inzwischen wöchentliche Dosierungsoptionen, mit auch oral verfügbaren Versionen, was eine wichtige Hürde für Menschen beseitigt, die die Vorteile ohne tägliche Injektionen wollten.
- Ultralang wirkende und wöchentliche Basalinsuline, einschließlich Kombinationsformulierungen, reduzieren die Injektionshäufigkeit selbst für Menschen, die weiterhin Insulin benötigen.
- Triple-Agonisten-Therapien, die drei separate Stoffwechselwege gleichzeitig ansprechen, befinden sich derzeit in Entwicklung und stellen den nächsten wahrscheinlichen Sprung in dieser Medikamentenklasse dar.

Metformins Beständigkeit

Inmitten all dieser Innovation bleibt Metformin, 1995 eingeführt, eine Erstlinienempfehlung für Typ-2-Diabetes und wurde sogar neu als bevorzugte Option zur Behandlung medikamenteninduzierter Blutzuckererhöhung bei Krebspatienten identifiziert, eine Erinnerung daran, dass nicht jeder Fortschritt in diesem Bereich brandneue Technologie ist.

Personalisiert, vorausschauend und aus der Ferne

Die neueste Schicht des modernen Diabetes-Managements ist kein einzelnes Gerät oder Medikament, es ist Software, die alles andere miteinander verbindet.

KI, die Probleme sieht, bevor sie passieren

Moderne Diabetes-Apps nutzen zunehmend KI, um vorherzusagen, wohin sich der Glukosewert in den nächsten Stunden basierend auf den individuellen Mustern einer Person wahrscheinlich entwickelt, statt generische, bevölkerungsweite Richtlinien anzuwenden. Manche Plattformen berücksichtigen inzwischen Stress, aktives Insulin und vergangene Trends, um einen wahrscheinlichen Anstieg oder Abfall zu melden, bevor er eintritt.

Erfassen, was der HbA1c-Wert übersieht

Neue Sensoren, die gleichzeitig Glukose und Ketone überwachen, kommen auf den Markt, mit dem Ziel, eine diabetische Ketoazidose früher zu erkennen; eine Analyse von 2026 fand, dass fast die Hälfte der DKA-Fälle erst erkannt wurde, als ein Patient bereits ins Krankenhaus eingeliefert wurde, genau die Art von blindem Fleck, den kontinuierliche Daten schließen sollen.

Versorgung, die dem Patienten folgt, nicht umgekehrt

Telemedizin und vernetzte Geräte bedeuten, dass Glukose- und Insulindaten heute aus der Ferne mit einem Behandlungsteam geteilt werden können, zwischen den Terminen, statt sie während eines gehetzten Termins alle paar Monate aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. Dieser Wandel ist besonders bedeutsam für Menschen in ländlichen Gebieten oder ohne einfachen Zugang zu spezialisierter endokrinologischer Versorgung.

Am Horizont

Mehrere Entwicklungen, die sich noch in Forschung oder früher Einführung befinden, deuten an, wohin sich das Diabetes-Management als Nächstes bewegt.

- Immuntherapie für Typ-1-Diabetes - Behandlungen, die den Ausbruch von Typ-1-Diabetes bei Menschen mit hohem genetischem Risiko verzögern sollen, sind ein aktives Forschungsfeld, mit dem Ziel, kostbare krankheitsfreie Jahre zu gewinnen, statt die Erkrankung erst nach ihrem Beginn zu behandeln.
- Betazell-Ersatz und Verkapselung - aus Stammzellen gewonnene insulinproduzierende Zellen, durch Verkapselungsgeräte vor Autoimmunangriffen geschützt, bleiben eine aktive Forschungsgrenze mit dem Ziel, die körpereigene Insulinproduktion wiederherzustellen, statt sie extern zu ersetzen.
- Kontinuierliche Ketonüberwachung - wird voraussichtlich bald breiter kommerziell verfügbar, kombiniert mit Glukosedaten, um einen aktuellen blinden Fleck beim DKA-Risiko zu schließen.
- Vollständig autonome Closed-Loop-Systeme - der logische Endpunkt der aktuellen AID-Entwicklung: Insulinabgabe ohne Kohlenhydratzählen, ohne Mahlzeitenankündigungen und mit minimaler täglicher Eingabe überhaupt.

Was sich nicht verändert hat

Bei all dem technologischen Wandel bleiben einige Grundlagen aus einem Jahrhundert genauso wahr wie heute.

- Ernährung und körperliche Aktivität zählen weiterhin enorm, kein Algorithmus ersetzt die grundlegenden Faktoren Essen und Bewegung.
- Diabetes bleibt unerbittlich; Geräte reduzieren die Belastung, beseitigen aber nicht die tägliche Realität des Lebens mit der Erkrankung.
- Zugangs- und Erschwinglichkeitslücken sind real und anhaltend; die fortschrittlichste Technologie ist nur bedeutsam, wenn Menschen sie sich tatsächlich leisten und beschaffen können.
- Menschliches Verhalten, Therapietreue, Stigma und diabetesbedingte Belastung bleiben für die Ergebnisse genauso zentral wie jedes Gerät oder Medikament auf dem Markt.

Ihren modernen Management-Plan aufbauen

Wenn Sie neue Technologie noch nicht erkundet haben

- Fragen Sie Ihr Behandlungsteam gezielt, ob Sie für ein CGM infrage kommen; die Leitlinien von 2026 haben die Berechtigung deutlich erweitert, ein früheres „Nein“ könnte jetzt ein „Ja“ sein.
- Falls Sie Insulin verwenden, fragen Sie, ob ein automatisiertes Insulinabgabesystem geeignet ist; mehrere frühere Voraussetzungen wurden kürzlich entfernt.
- Falls die Häufigkeit von Nadeln eine Hürde war, fragen Sie nach wöchentlichen oder oralen Medikamentenoptionen, die es vor wenigen Jahren noch nicht gab.

Wenn Sie bereits moderne Werkzeuge nutzen

- Überprüfen Sie bei Ihrem nächsten Termin Ihre Time in Range, nicht nur den HbA1c-Wert; sie erzählt eine vollständigere Geschichte der täglichen Kontrolle.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Behandlungsteam zwischen den Terminen aus der Ferne auf Ihre Gerätedaten zugreifen kann, statt sie nur persönlich zu besprechen.

So oder so

- *Behalten Sie die Grundlagen im Blick: Ernährung, Bewegung und Schlaf bleiben das Fundament, auf dem jedes Gerät und Medikament aufbaut.*


Ein Jahrhundert, um zum Körper aufzuschließen

Die Geschichte des Diabetes-Managements ist im Grunde die Geschichte davon, immer näher an das heranzukommen, was eine gesunde Bauchspeicheldrüse automatisch tut, Glukose in Echtzeit erfassen, genau die richtige Menge Insulin freisetzen, Moment für Moment, ohne dass man sie darum bitten muss. Es dauerte ein Jahrhundert, hierher zu gelangen, Jahrzehnte, in denen eine lebensbedrohliche Krankheit mit gekochtem Urin, Raten und starren Routinen gemanagt wurde.

Die heute verfügbaren Werkzeuge hätten den Ärzten, die Leonard Thompson 1922 erstmals behandelten, wie Fiktion erschienen. Die Richtung ist klar: weniger Raten, weniger manuelle Belastung, und eine Behandlung, die sich zunehmend an die Person anpasst, nicht umgekehrt.

„Insulin heilte Diabetes 1922 nicht, und keine heutige Technologie tut das auch nicht. Was sich geändert hat, ist, wie viel weniger die Krankheit den Tag bestimmen muss.“

Kurzübersicht: Früher gegen heute



Die Krankheit ist nicht einfacher geworden. Die Werkzeuge, sie zu managen, sind dramatisch besser geworden.